

平成30年5月21日 21時40分

福岡県保健医療介護部 がん感染症疾病対策課感染症対策係 長田、中村 内線 3079・3080 直通 092-643-3268
--

麻しん患者の発生について（第7報）

平成30年5月21日、粕屋保健福祉事務所管内の医療機関から麻しんの届出が1件、筑紫保健福祉環境事務所管内の医療機関から麻しんの届出が1件ありましたので、お知らせします。

1 患者

【平成30年15例目】

(1) 年齢等

20歳代、男性、福岡市東区在住
ワクチン接種歴は2回

(2) 経過

4月28日 発熱が出現
4月29日 鹿児島県薩摩川内市内の医療機関Aを受診
4月30日 発疹が出現
5月7日 症状が消失し、帰福
5月9日 本人が麻しんに患っていたことを疑い、糟屋郡内の医療機関Bを受診
5月21日 医療機関Bが発生届出

※ 現在、患者は治癒しており、人に移す可能性はありません。また、福岡県内に当該患者に係る健康観察の対象者はありません。

【平成30年16例目】

(1) 年齢等

生後6か月、男性、福岡市博多区在住
ワクチン接種歴は1回（平成30年5月12日接種）
平成30年5月11日に公表した麻しん患者に係る健康観察中の方（表1 No3）

(2) 経過

5月20日 発熱、発疹が出現
春日市内の医療機関Cを受診
5月21日 医療機関Cが発生届出、県保健環境研究所の遺伝子検査で麻しん陽性

※ 人に移す可能性がある期間は自宅にいたため、新たな健康観察の対象者はありません。

2 行政対応

粕屋保健福祉事務所、筑紫保健福祉環境事務所、福岡市東保健所及び博多保健所が連携し、患者、家族及び医療機関に対し健康調査、疫学調査を実施し、二次感染予防の指導を行っています。
なお、患者の行動履歴等、詳細については調査中です。

《県民の皆様へ》

- 症状(別紙参照)から麻しんが疑われる場合、事前に医療機関へ電話連絡の上、速やかに受診してください。
- 受診の際には、公共交通機関等の利用は控えてください。

《医療機関の皆様へ》

- 発熱や発疹を呈する患者が受診した際は、麻しんの予防接種歴の確認等、麻しんの発生を意識した診療をお願いします。
- 患者(疑い含む。)は、個室管理を行う等、麻しんの感染力の強さを踏まえた院内感染対策を実施してください。
- 臨床症状等から麻しんと診断した場合には、速やかに保健所へ届け出てください。

お 願 い

※ 報道機関各位におかれましては、患者及び患者家族等について、本人等が特定されないことがないよう、格段の御配慮をお願いします。

【表1 県内の患者情報】

No	年齢	性別	居住地	予防接 種歴	発症日	検査確認日	備考
1	非 公 表						二次感染なし
2	20代	男性	春日市	1回	4月27日	5月2日	流行地へは行ってない
3	30代	男性	福岡市 博多区	不明	5月10日	5月11日	No2と医療機関で接触 した可能性
4	3歳	男性	大野城市	無	5月9日	5月12日	No2と医療機関で接触 した可能性
5	30代	女性	福岡市 南区	不明	5月10日	5月13日	No2と医療機関で接触 した可能性
6	10代	男性	春日市	無	5月8日	5月13日	No2が利用した小売店 で接触した可能性
7	30代	女性	春日市	1回	5月11日	5月14日	
8	20代	女性	大野城市	不明	5月10日	5月15日	
9	2か月	女性	福岡市 城南区	無	5月13日	5月15日	No2と医療機関で接触 した可能性
10	40代	男性	糸島市	不明	5月11日	5月18日	
11	20代	男性	大野城市	2回	5月15日	5月18日	No2と医療機関で接触 した可能性
12	20代	男性	福岡市 早良区	不明	5月15日	5月18日	
13	20代	男性	福岡市 城南区	2回	5月16日	5月18日	No2と医療機関で接触 した可能性
14	20代	女性	福岡市 城南区	2回	5月17日	5月18日	No2と医療機関で接触 した可能性
15	20代	男性	福岡市 東区	2回	4月28日		
16	6か月	男性	福岡市 博多区	1回	5月20日	5月21日	No3に係る健康観察中 の方

麻疹（はしか）について

- 麻疹（はしか）は、麻疹ウイルスによる感染症です。
- 感染力がきわめて強く、麻疹の免疫がない集団に 1 人の発症者がいたとすると、12～14 人の人が感染すると言われていて（インフルエンザでは 1～2 人）。
- ほぼ 100% の人に症状が現れますが、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

《症状》

- 麻疹ウイルスに感染して 10～12 日後に、発熱や咳などの症状が現れます。
- 38℃前後の発熱が 2～4 日間続き、倦怠感、上気道炎症状（咳、鼻水、くしゃみなど）、結膜炎症状（結膜充血、目やに、光をまぶしく感じるなど）が現れて次第に強くなります。
- 発疹が現れる 1～2 日前ごろに口の中の粘膜に 1mm 程度の白い小さな斑点（コプリック斑）が出現します。コプリック斑は麻疹に特徴的な症状ですが、発疹出現後 2 日目を過ぎるころまでに消えてしまいます。
- コプリック斑出現後、体温は一旦下がりますが、再び高熱が出るとともに、赤い発疹が出現し全身に広がります。
- 発疹出現後 3～4 日で回復に向かい、合併症がない限り 7～10 日後には主症状は回復しますが、免疫力が低下するため、しばらくは他の感染症に罹ると重症になりやすく、体力などが戻るのに 1 か月くらいかかることも珍しくありません。
- 麻疹に伴って肺炎、中耳炎、脳炎などさまざまな合併症がみられることがあります。特に脳炎は、頻度は低い（1000 人に 1 人）ものの死亡することがあり、注意が必要です。

《感染予防とまん延防止のために》 ～一人ひとりが気をつけましょう～

- 麻疹は、感染力がきわめて強いことから手洗いやマスクのみでの予防はできませんが、予防接種（ワクチン接種）を行うことによって、95%以上の人が免疫を獲得し、予防することができます。
- 予防接種は、自分が感染しないためだけでなく、周りの人に感染を広げないためにも有効です。
- 医療・教育関係者や、海外渡航を計画されている方は、麻疹の罹患歴や予防接種歴を確認し、明らかでない場合は予防接種を検討してください。
- 麻疹の予防接種歴がない方で、発熱、咳、鼻水、眼球結膜の充血等 麻疹に特徴的な症状が現れた方は、事前に医療機関に電話で連絡し、指示に従って受診してください。その際、症状出現日の 10～12 日前（感染したと推定される日）の行動（海外の流行地や人が多く集まる場所へ行ったかどうか等）について、医療機関にお伝えください。

《麻疹の予防接種について》

～1 歳になったら 1 回、小学校入学前の 1 年間にもう 1 回予防接種を受けましょう～

「生後 12 月から生後 24 月に至るまでの間にある者」及び「5 歳以上 7 歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の 1 年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者」は、予防接種法に基づく定期の予防接種を受けることができます。

- ※ 接種を希望される方は、お住まいの市町村の予防接種担当課にお問い合わせください。
- ※ 定期の予防接種の対象者以外の方で、麻疹の予防接種を希望される場合は、予防接種法に基づかない任意の接種で受けることができます（費用は自己負担となります）。医療機関の医師にご相談ください。
- 麻疹の流行がみられる国に渡航される方は、予防接種をご検討ください。なお、海外の流行情報は検疫所のホームページ（<http://www.forth.go.jp/>）で確認することができます。