4 採卵鶏農場におけるワクモ対策の取り組み

筑後家畜保健衛生所 ○樋口 真、富永 知宏
中央家畜保健衛生所 永野 由佳

ワクモが鶏に寄生すると吸血による貧血を引き起こし、重度になると死亡する。また、寄生ストレスによる産卵率の低下、ワクモの排泄物や吸血したワクモがつぶれたことによる汚卵等の被害も及ぼす[1, 2]。ヒトに対してはアレルギーや痒みを伴う発疹、不快感等を与え、離職の原因となるなど様々な被害をもたらすため、養鶏業界で広く問題になっている[3]。

今回、管内の採卵鶏農場において、令和2年度からワクモ対策に取り組み、実地検証を重ねながら対策を継続した結果、一定の成果を得たのでその概要を報告する。

1 農場の概要

対象農場は採卵鶏700羽（内、ケージ飼い230羽）を飼養。ケージ飼い鶏舎にて令和2年8月と令和3年7月に2年続けてロイコトゾーン症が発生し、いずれもワクモの重度寄生が認められていた。

2 対策の経緯

令和2年8月にワクモの重度寄生を確認以

降、当該農場ではワクモ対策として、ワクモトラップ設置、清掃後に熱湯とバーナーによる生息場所の殺虫、オールアウト時にカーバメイト系殺虫剤の鶏舎内噴霧を実施した。しかし、令和3年7月末に重度寄生が再び認められたため、同年8月に当所と農場で協議し対策を変更強化し、効果判定を随時実施することとした。変更後の対策は、清掃後の殺虫を珪藻土製剤の噴霧（1回/月）に変更し、オールアウト時の鶏舎内噴霧にはカーバメイト系に加え、ピレスロイド系殺虫剤を追加した。令和4年度からは、オールアウト時の鶏舎内噴霧に珪藻土製剤を追加した（表1）。

3 対策の効果判定方法

- (1) 聞き取り調査：鶏舎内におけるワクモ発生状況と産卵率を毎月聴取した。
- (2) Ht値測定と臨床検査：令和2年8月、令和3年5～12月、令和4年7～11月に約10羽/回について採血及び鶏冠退色等の貧血徴候を調査した。
- (3) 捕虫調査：福岡県農林業総合試験場にて報告されたワクモ数モニタリング法[4]

表1 対策の経緯

時系列	事象	対策					
		ワクモトラップ (ダンボール)	月1回		不定期(アウト時)		
			熱湯+ バーナー	珪藻土 製剤	カーバ メイト系	ピレス ロイド系	珪藻土 製剤
R2.8月	ロイコ+ ワクモ発生	○	○		○		
R3.7月	再び、発生	○	○		○		
R3.8月	対策の見直し			○	○	○	
R4.7月	対策を強化			○	○	○	○

ワクモ数	寄生指数	トラップ内状況
0	0	
1~10	1	
11~100	2	
101~1000	3	
1001~10000	4	
10001~	5	

図1 トラップ視認による寄生指数判定方法

を令和3年7月、令和4年7、9月に実施。1日設置したトラップ内のワクモの状況を肉眼的に寄生指数0から5までの6段階で判定した(図1)。この判定方法では、寄生指数3以上のトラップ数が20%以上となる前に駆除を開始する必要があるとされている。

4 結果

(1) 聞き取り調査：令和3年7月までは多数のワクモが発生していたが、対策変更後はワクモの数が激減し、令和4年度はほとんど認めなかった。産卵率は令和2年8月と令和3年7月、8月の重度寄生時に80%以下まで低下したが、対策変更後は回復し、それ以降は標準値で推移した(表2)。

(2) Ht値測定と臨床検査：対策期間にお

ける平均Ht値の推移は、ロイコチトゾーンとワクモが寄生した令和2年8月に平均Ht値19.6%、再度感染した令和3年7月は平均Ht値21%であったが、同年8月に対策変更後は平均Ht値が増加傾向をみせた(表2)。貧血徴候については令和2年8月は重度の鶏冠退色、元気消失等が認められ検査を実施した全羽に認められた。令和3年7月も18羽中13羽にて認めたが、令和3年8月の対策変更後は鶏冠退色具合が緩和すると共に割合も13羽中6羽と減り始め、令和4年8月には検査した全羽で認められなかった(図2)。

(3) 捕虫調査：R3.7月は設置した8個のトラップすべてが寄生指数5を示し、ワクモの大量発生が確認されたため、早急な対応が必要な状況であった。対策変更後の令和4年7月は寄生指数0が8個、寄生指数1が7個、

表2 産卵率とHt値の推移

ワクモ数	寄生指数	トラップ内訳 (個)		
		R3.7月	R4.7月	R4.9月
0	0	0	8	16
1~10	1	0	7	0
11~100	2	0	1	0
101~1000	3	0	0	0
1001~10000	4	0	0	0
10001~	5	8	0	0

図3 捕虫調査結果

図2 貧血徴候と割合

表3 ワクモ被害低減までの推移

時系列	事象	検査結果	対策					
			ワクモ トラップ	月1回		不定期(アウト時)		
				熱湯+ バーナー	珪藻土 製剤	カーバ メイト系	ピレス ロイド系	珪藻土 製剤
R2.8月	ロイコ+ ワクモ発生	貧血++ 産卵率↓	○	○	○			
R3.7月	再び、発生	貧血++ 産卵率↓ 寄生指数5	○	○	○			
R3.8月	対策の見直し	貧血回復傾向 ワクモ数減少		○	○	○		
R4.7月	対策を強化	貧血- 寄生指数0~2		○	○	○	○	
R4.9月		貧血- 寄生指数0		○	○	○	○	

寄生指数 2 が 1 個とワクモ数の大幅な減少が認められ、同年 9 月にはすべてのトラップが寄生指数 0 を示し、ワクモを認めなくなった（図 3）。

5 まとめ

令和 2 年 8 月から開始した従来の対策は再発するなど十分な効果が得られなかったため、令和 3 年 8 月に大幅な変更を指導し、珪藻土製剤とピレスロイド系殺虫剤を導入した。また、効果判定として、聞き取り調査、血液検査及び臨床検査、捕虫調査を同時実施した。その結果、対策変更後ワクモ数は激減、貧血徴候を示す個体を認めなくなった（表 3）。その理由として、効果判定結果を目で分かるようにデータで示したことで、農場のモチベーションを保たせることにつながり、地道に対策を継続することができたと考える。また、珪藻土製剤の虫体脱水惹起効果が殺虫につながったことや、ピレスロイド系殺虫剤は使用実績がなかったことで耐性が出現しておらず、顕著な効果が出たと推察された。珪藻土製剤は、殺虫剤と異なり物理的殺虫効果を持つため、耐性を獲得する恐れがなく、ワクモへも良く効くことから、今後も継続して使用するよう指導し、ピレスロイド系殺虫剤は今後耐性を獲得する恐れがあるため、農場管理者に薬剤変更等の慎重使用を指導している。また、この対策を他農場で応用する場合、地道に継続できる人員や時間の確保が必須であるため、継続可能かどうか重要なポイントであると考えられる。

引用文献

- [1] Kirkwood AC. Anemia in poultry infested with red mite *Dermanyssus gallinae*. *The Veterinary Record* 80, 514-515 (1967)
- [2] 大塩行夫：家畜害虫 40-73. 中央畜産会、東京 (1979)

- [3] 村野多可子、並木一男、椎名幸一、安川久：日本獣医師会雑誌 61、287-293 (2008)
- [4] 九州沖縄農業試験研究推進会議成果情報：ワクモトラップを活用した簡易な駆除適期の判定法 (2016)