

別表 1

妊娠中毒症等療養援護費支給対象者認定基準表

分 類		症 候	亜分類
1 妊娠 高血 圧症 候群	(1)妊娠高血圧腎症	妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、かつ蛋白尿を伴うもので、分娩後 12 週までに正常に復する場合	【軽症】 血圧) 次のいずれかに該当する場合 収縮期血圧 140mmHg 以上、 160mmHg 未満の場合 拡張期血圧 90mmHg 以上、 110mmHg 未満の場合 蛋白尿) $\geq 300\text{mg/日}$ 、 $< 2\text{g/日}$ 【重症】 血圧) 次のいずれかに該当する場合 収縮期血圧 160mmHg 以上の 場合 拡張期血圧 110mmHg 以上の 場合 蛋白尿) 2g/日 以上の時は蛋白尿重症
	(2)妊娠高血圧	妊娠 20 週以降に初めて高血圧が発症し、分娩後 12 週までに正常に復する場合	
	(3)加重型妊娠高血圧腎症	・高血圧症が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降蛋白尿を伴う場合 ・高血圧と蛋白尿が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降、いずれかまたは両症状が憎悪する場合 ・蛋白尿のみを呈する腎疾患が妊娠前あるいは妊娠 20 週までに存在し、妊娠 20 週以降に高血圧が発症する場合	
	(4)子癇	妊娠 20 週以降に初めて痙攣発作を起こし、てんかんや二次性痙攣が否定されるもの	
2 糖 尿 病	(1)妊娠糖尿病	75gOGTT において次の基準の 1 点以上を満たした場合 ① 空腹時血糖値 $\geq 92\text{mg/dL}$ (5.1mmol/L) ② 1 時間値 $\geq 180\text{mg/dL}$ (10.0mmol/L) ③ 2 時間値 $\geq 153\text{mg/dL}$ (8.5mmol/L)	
	(2)妊娠時に診断された明らかな糖尿病	以下のいずれかを満たした場合 ① 空腹時血糖値 $\geq 126\text{mg/dL}$ ② HbA1c $\geq 6.5\%$ (HbA1c(JDS) $\geq 6.1\%$) ③ 確実な糖尿病網膜症が存在する場合 ④ 随時血糖値 $\geq 200\text{mg/dL}$ あるいは 75gOGTT で 2 時間値 $\geq 200\text{mg/dL}$ で上記①～③のいずれかがある場合	
3 貧血		血色素がおおむね 8g/dl 以下のもの	
4 産科出血		産科出血により出血多量（経膣 1L，帝切 2L 以上、または S I : 1 以上）で輸血その他の応急処置を必要とするもの $\left(\frac{* \text{S I} = \text{心 拍 数}}{\text{収縮期血圧}} \right)$	
5 心疾患		先天性あるいは後天性の心疾患を有し、心不全、肺水腫、心内膜炎、心房細動等の不整脈等病態の悪化が認められるもの	

【参考】妊娠高血圧症候群：妊娠高血圧症候群管理ガイドライン 2009

【参考】糖尿病、産科出血：産婦人科診療ガイドライン産科編 2011