

いしき けいれん・意識がおかしい

からだ ふる わせ、よ 呼びかけに はんのう 反応しない

かんさつ 観察のポイント

- ・ 顔いろ しせんむ 顔色、視線の向きはどうか
- ・ てあし ようす 手足の様子はどうか（ピーン、がくがく、ダラーン）
- ・ おかしな動きは、からだ みぎがわ ひだりがわ 身体の右側にも左側にもみられるか
- ・ とけい 時計をみて、けいれんがつづいている時間を確認しましょう
- ・ けいれんが おちついたら、たいおん そくてい 体温を測定してください
- ・ けいれんが とまったあとに、なまえ よ 名前を呼んで反応するか

ただちに、きゅうきゅうしゃ ようせい ただちに、救急車を要請

- ✓ 5分以上つづくとき（はじめてのときはその限りではありません）
- ✓ 顔がまっしろだったり、くちびるがむらさきいろだったりするとき
- ✓ けいれんのあと、よ 呼びかけに はんのう わる 反応が悪いとき
- ✓ く かえ 繰り返しおこしたとき

じゅしん じかんい すぐに受診（3時間以内）

- ✓ からだ かたがわ 身体の片側だけが、けいれんしていたとき
- ✓ さいきん あたま はげ う 最近、頭を激しく打ったことがあるとき
- ✓ おうと く かえ 嘔吐を繰り返すとき
- ✓ げんき 元気がなかったり、ぐったりしているとき
- ✓ せいご げつみまん 生後6か月未満



きょうじゅう じゅしん じかん い ない
今日中に受診（6時間以内）

- ✓ 今回のけいれんが、人生ではじめてで、けいれんが止まった
あと いしき ふだん か
後に意識が普段と変わらないとき

よくじつ じゅしん じかん い ない
翌日に受診（12～24時間以内）

- ✓ 今までに医師から「熱性けいれん」と言われ、けいれんも
かい だけで ふん い ない と
1回だけで5分以内に止まり、意識が普段と変わらないとき



せんもんい せんもんい
専門医からのワンポイント・アドバイス

か
家庭でのケアのポイント

- ・あわてず、まわりにある危険な物をよけましょう
- ・顔を横に向け、吐いたもので窒息しないよう注意しましょう
- ・口の中に指や割りばしなどを入れないようにしましょう
- ・揺すったり、たたいたりしないようにしましょう

い
医師に伝えてほしいこと

- ・今まで、けいれんを起こしたことがあるか
- ・家族にけいれんをしたことのある方がいるか
- ・発熱の有無
- ・けいれん中の様子