

てあし うご 手足を動かさない

もともとできていた手足の動きが不自由な状態

かんさつ 観察のポイント

- ・ 手足が腫れているか
- ・ 痛みやしびれがあるか
- ・ 触っているのがわかるか
- ・ 手足の色が悪いか
- ・ 不機嫌や発熱などの、その他の症状があるか
- ・ 手足のどの部分の動きが悪いか
(左右両方か片方か、手だけか足だけか)
- ・ 症状が急に起こったか、徐々に起こったか
- ・ 症状が持続するか、よくなったり悪くなったりするか

ただちに、救急車を要請

- ✓ 意識が悪い
- ✓ 呼吸がしにくそう
- ✓ しゃべりにくい

すぐに受診 (3時間以内)

- ✓ 外傷(けが)の後に変形や腫れがある
- ✓ 動かさない
- ✓ 動かさなくなった手足の関節が腫れていたり、赤くなったり、熱くなったりしている



よくじつ じゅしん じかんいなし
翌日に受診（12～24時間以内）

- ✓ しょうじょう いちじてき かいぜん きげん
症状が一時的で、改善して機嫌もよい
- ✓ いぜん おな しょうじょう いりょうきかん へしんだん う こんかい
以前にも同じ症状があり、医療機関で診断を受け、今回は
しょうじょう
症状がよくなっている
- ✓ しょうじょう うった ある かた ちが
症状の訴えははっきりしないが、歩き方がいつもと違う



せんもんい
専門医からのワンポイント・アドバイス

か
家庭でのケアのポイント

- ・ こどもは、しょうじょう しょうず つた はんだん まよ
症状を上手に伝えられないので判断に迷うことも
おおいでしょう。はんだん なや しょうにかい そうだん
判断に悩むことがあれば小児科医に相談して
ください。

い
医師に伝えてほしいこと

- ・ しょうじょう きゅう お じょじょ お
症状が急に起こったか、徐々に起こったか
- ・ てあし は いた う む ていど
手足の腫れ・痛みやしびれの有無・程度
- ・ さわ いろ わる
触っているのがわかるか ・色が悪いか
- ・ ふ きげん はつねつ た しょうじょう
不機嫌や発熱などの、その他の症状があるか
- ・ てあし ぶぶん うご わる
手足のどの部分の動きが悪いか
- ・ しょうじょう じぞく わる
症状が持続するか、よくなったり悪くなったりするか