

あたま う 頭を打った

ずつう おうと はんのう にぶ かのうせい
頭痛や嘔吐、反応が鈍くなる可能性があります

かんさつ 観察のポイント

- ずつう う む
・ 頭痛の有無
- はきけ おうと う む
・ 吐き気、嘔吐の有無
- けいれん う む
・ けいれんの有無
- はんのう う む ふだん う こた
・ 反応の有無（普段どおり／受け答えがあいまい）

ただちに、きゅうきゅうしや ようせい 救急車を要請

- ✓ しせん あ はんのう まった うご
視線が合わない、つねっても反応しない、全く動かない
- ✓ たくさん ち ち
たくさん血が出ていて、止まらない
- ✓ けいれん している

じゅしん じかん いな すぐに受診（3時間以内）

- ✓ はんのう
反応がないときがあった
- ✓ おうと
嘔吐があった
- ✓ たくさん ち で ち で きず
たくさん血が出た、血が出るような傷ができた

きょうじゅう じゅしん じかん いない
今日中に受診（6時間以内）

- ✓ たんこぶが^{おお}大きくなってきた
- ✓ ぐったりしていて^{げんき}元気がない

よくじつ じゅしん じかん いない
翌日に受診（12～24時間以内）

- ✓ いつもどおりだが、たんこぶが^き気になる
- ✓ いつもどおりだが、^{しんぱい}心配・^{ふあん}不安



せんもんい せんもんいからのワンポイント・アドバイス

か 家庭でのケアのポイント

- ・ ^{あたま}頭を^う打った^{あと}後の^{ようす}様子を^{かんさつ}観察しましょう
- ・ ^{しゅっけつ}出血している^{ばあい}場合は、きれいなタオルで^お押さえましょう
- ・ たんこぶは^ひ冷やしてあげましょう
- ・ ^{あたま}頭を^う打ってから^{いちにち}一日は^{ようす}様子を^{かんさつ}観察しておきましょう

い 医師に伝えてほしいこと

- ・ どのような^{じょうきょう}状況で^{あたま}頭を^う打ったか
- ・ いつもと異なる^{こと}様子^{ようす}があるか