

おね なか う 胸やお腹を打った

おね いた うとう なか いた て かのうせい
胸の痛み、嘔吐やお腹の痛みが出る可能性があります

かんさつ 観察のポイント

- いた う お いた つよ いた
・ 痛みの有無、痛みが強くないか、痛みがひどくなっていないか
- いきぐる むなぐる う お
・ 息苦しさ、胸苦しきの有無
- は け おうと う お
・ 吐き気、嘔吐の有無
- は べん ち ま
・ 吐いたものや便に血が混じっていないか

ただちに、きゅうきゅうしゃ ようせい 救急車を要請

- ✓ しせん あ はんのう まった うご
視線が合わない、つねっても反応しない、全く動かない
- ✓ おね なか いた つよ いた うご
胸やお腹の痛みが強い、痛みで動けない
- ✓ いきぐる
息苦しそう
- ✓ おうと と
嘔吐が止まらない

じゅしん じかんい すぐに受診（3時間以内）

- ✓ は べん ち ま
吐いたものや便に血が混じっている
- ✓ たん ち ま あか
痰やおしっこに血が混じっている、赤い
- ✓ う ち て ち て きず
打ったところから血が出た、血が出るような傷ができた

きょうじゅう じゅしん じかんいなし
今日中に受診（6時間以内）

- ✓ ねつ^で熱が出てきた
- ✓ いた^み痛みがよくならない
- ✓ おうと^し嘔吐した

よくじつ じゅしん じかんいなし
翌日に受診（12～24時間以内）

- ✓ いつもどおりだが、しんぱい^{ふあん}心配・不安



せんもんい
専門医からのワンポイント・アドバイス

か^{てい}
家庭でのケアのポイント

- ・ むね^{なか}胸やお腹を打った^う後の様子^{あと}を観察^{ようす}しましょう
- ・ びょういん^い病院に行く前に、の^{たま}飲んだり食^たべたりするのは避け^さけましょう

い^し
医師に伝えてほしいこと

- ・ どん^{じょうきよう}な状^{むね}況^{なか}で胸^うやお腹^うを打ったか
- ・ いつもと異なる^{こと}様子^{ようす}があるか