

いんぶ 陰部のけが

せいき こうもん にょうどう
性器や肛門、尿道のけが

かんさつ 観察のポイント

- ・ けががどこにあるか、血が^ち出^でていないか
- ・ おしっこが^で出るか、血が^ち混^まじってないか
- ・ 痛みが^{いた}どんどん^{つよ}強くな^なっていないか

ただちに、きゅうきゅうしや ようせい 救急車を要請

- ✓ どんどん血が^ち出^でてきて止^とまらない
- ✓ 陰部が^{いんぶ}ひどく^は腫^はれている・強い^{つよ}痛み^{いた}がある

すぐに^{じゅしん}受診^{じかんい}（3時間以内）

- ✓ おしっこに血が^ち混^まじっている
- ✓ おしっこが^で出ない
- ✓ 血が^ち出^でている
- ✓ 性器が^{せいき}腫^はれている

きょうじゅう じゅしん じかん ない
今日中に受診（6時間以内）

- ✓ きず は 傷が腫れている
- ✓ きず いた 傷を痛がる

よくじつ じゅしん じかん ない
翌日に受診（12～24時間以内）

- ✓ いつもどおりだが、しんぱい・ふあん 心配・不安
- ✓ いた は 痛みや腫れがひかない



せんもんい 専門医からのワンポイント・アドバイス

か 家庭でのケアのポイント

- ・ けがをした場所を見せたくない場合があるため、わからないときは病院を受診しましょう
- ・ 陰部をけがしたときも、お腹の痛みを訴えることもあるので注意しましょう

い 医師に伝えてほしいこと

- ・ どんな状況、どのようなものでけがをしたか
- ・ いつもと異なる様子があるか