

7 農林試第2929号
令和8年1月23日各関係機関団体の長
各 病 害 虫 防 除 員 } 殿福岡県農林業総合試験場長
(福岡県病害虫防除所)

令和7年度病害虫発生予報第11号（2月）について

このことについて、病害虫発生予報第11号を発表したので送付します。

予報第11号

2月における主な病害虫の発生動向は、次のように予想されます。

作物名	病害虫名	現況 (発生量)	2月の発生予報 (発生量)	
		平年比	平年比	前年比
イチゴ	灰色かび病 うどんこ病 ハダニ類	やや多 並 少	並 並 やや少	並 並 やや少
冬春トマト	すすかび病 コナジラミ類	やや少 ³⁾ 並 ³⁾	— ³⁾ — ³⁾	やや少 並
冬春ナス	灰色かび病 すすかび病 ミナミキイロアザミウマ	並 並 並	並 並 並	並 並 並
冬レタス ⁴⁾	灰色かび病 菌核病	並 並	並 並	並 並
冬キャベツ	黒腐病 菌核病 コナガ	やや少 やや少 並	やや少 やや少 並	並 並 並

注 1) 予報の発生量は平年（福岡県の過去10年間）及び参考として前年との比較で、
「少、やや少、並、やや多、多」の5段階で示しています。

注 2) 予報の根拠には、巡回調査、防除員の調査、予察灯・トラップでの誘殺状況調査等に基づく発生状況、気象予報からみた病害虫の発生条件を必要に応じて記載しています。
 それぞれの条件は、少発生（-）、やや少発生（-～±）、並発生（±）、やや多発生（±～+）、多発生（+）として示し、+を総合的に判断して発生量を予想しています。

注 3) 冬春トマトについては2022年度からの調査で平年値が無いため、前年比を記載しています。

注 4) 冬レタスについては2020年度まで玉レタス、2021年度以降リーフレタスを調査。平年値は両方を合わせた10年間の平均としています。

<予想される向こう1か月の天候（令和8年1月24日～令和8年2月23日）>

昨年10月中旬以降、低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いている。向こう1か月の降水量も、低気圧の影響を受けにくいため、少ないでしょう。また、向こう1か月の日照時間は平年並か多いでしょう。寒気の影響を受けやすい時期があるため、向こう1か月の気温は平年並か低いでしょう。

向こう1か月の気温・降水量・日照時間（数値は予想される出現確率）

	平均気温	降水量	日照時間
九州北部地方	低40 並40 高20% 平年並か低い見込み	少50 並30 多20% 少ない見込み	少20 並40 多40% 平年並か多い見込み

（福岡管区気象台 令和8年1月22日発表1か月予報より抜粋）

病害虫防除所のホームページでは、各種病害虫の発生状況を随時更新しています。
発生状況の把握や防除の参考にご活用下さい。

○福岡県病害虫防除所のホームページへのアクセス

URL: <https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-bouzyosyo.html>
または右QRコード①

①⇒



○X（旧Twitter）で定期情報や注意報等発出のお知らせをしています。

Xの本アカウント（福岡県農作物病害虫情報）へのアクセス

URL : https://x.com/PPDPO_Fukuoka または右 QR コード②

②⇒



【野菜：イチゴ】

1 灰色かび病

（1）予報の内容

発生量：平年・前年並

（2）予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年よりやや多発生であった（±～+）。

発病果率 0.07%（平年 0.04%、前年 0.03%）

発生ほ場率 21.4%（平年 17.2%、前年 14.3%）

イ 向こう1か月の気象予報では、やや少発生の条件となっている（-～±）。

（3）防除上注意すべき事項

ア 発病果、発病葉は見つけ次第速やかに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。

イ 収穫後の花梗枝は、放置すると感染源となりやすいので、早めに取り除く。


ウ 適切にハウス内の換気を行い、湿度の低下を図る。

エ 不要な下葉は早めに除去する。下葉かぎ後に防除を行うと効果的で、薬液が果実を含む株全体にかかるように丁寧に散布する。

オ 病勢が進展すると防除が困難になるので、発生状況に注意し、初期防除を徹底する。

カ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

キ 農薬の使用及び散布等にあたっては、最終ページの内容を確認の上、適切に実施する（以下の病害虫についても同様）。



2 うどんこ病

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年並

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年並であった（±）。

発病株率 0%（平年 0.1%、前年 0.1%）

発病果率 0%（平年 0.0%、前年 0%）

発生ほ場率 0%（平年 2.7%、前年 7.1%）

イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている（±）。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病果、発病葉は見つけ次第速やかに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。


イ 収穫後の花梗枝は、放置すると感染源となりやすいので、早めに取り除く。

ウ 適切にハウス内の換気を行い、湿度の低下を図る。

エ 不要な下葉は早めに除去する。下葉かぎ後に防除を行うと効果的で、薬液が葉裏にもかかるように丁寧に散布する。

オ 病勢が進展すると防除が困難になるので、発生状況に注意し、初期防除を徹底する。

カ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローション散布する。



うどんこ病の発生推移

3 ハダニ類

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年よりやや少

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年より少なかつた（-）。

寄生株率 1.3%（平年 12.7%、前年 1.6%）

発生ほ場率 28.6%（平年 47.6%、前年 28.6%）

イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている（±）。

(3) 防除上注意すべき事項

ア ほ場内や周辺の雑草は増殖の場となるので、除草を徹底する。除草した雑草や摘葉した葉はハウス内に放置せず、ビニル袋等に入れて密封し処分する。

イ 多発後は防除が困難になるので、発生状況に注意し、初期防除を徹底する。

ウ 薬剤感受性が低下しやすいので、気門封鎖剤も利用し、異なる系統の薬剤をローション散布する。


エ ハダニ類に登録のある薬剤の多くは浸透移行性が乏しいため、葉裏に薬液が十分付着するよう丁寧な散布を心がける。防除は摘葉後に行うと効果的である。

オ ミツバチに影響が少ない薬剤を使用する。

カ 化学薬剤だけでは防除が困難であるため、天敵を利用した総合的防除を積極的に実施する。

＜県ホームページ掲載の「令和7年度版病害虫・雑草防除の手引き」－「IPMの推進」－
「イチゴのIPMマニュアル」参照＞

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/749464_62334252_misc.pdf



ハダニ類の発生推移

【野菜：冬春トマト】

※2022年度からの調査のため、平年値無し。

1 すすかび病

(1) 予報の内容

発生量：前年よりやや少

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は前年よりやや少なかった（～土）。

発病葉率 0%（前年 0.5%）

発生ほ場率 0%（前年 33.3%）

イ 向こう1か月の気象予報では、やや少発生の条件となっている（～土）。


(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病葉は速やかに除去する。

イ 多湿にならないように換気に注意するとともに、ほ場の排水対策も心掛ける。

ウ 病勢が進展すると防除が困難になるので、発生状況に注意し、初期防除を徹底する。

エ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



2 コナジラミ類

(1) 予報の内容

発生量：前年並

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は前年並であった（土）。

寄生葉率 1.0%（前年 2.5%）

発生ほ場率 50.0%（前年 50.0%）

イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている（土）。

(3) 防除上注意すべき事項


ア コナジラミ類はトマト黄化病及びトマト黄化葉巻病の病原ウイルスを媒介するため、防除を徹底する。

イ 多発後は防除が困難になるので、発生状況に注意し、発生初期の防除を徹底する。また、定期的な薬剤散布を実施する。

ウ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

エ ほ場内や周辺の雑草は増殖の場となるので、除草を徹底する。

オ 施設内への成虫の飛び込みを防止するため、防虫ネットの目合は 0.4mm 以下にする。



【野菜：冬春ナス】

1 灰色かび病

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年並

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年並であった（土）。

発病果率 0%（平年 0.2%、前年 0%）

発生ほ場率 0%（平年 17.1%、前年 0%）


イ 向こう1か月の気象予報では、やや少発生の条件となっている（～土）。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病果、発病葉は見つけ次第速やかに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。

イ 不要な枝葉は除去、処分し、通風、採光をよくする。

ウ 多湿にならないように換気に注意するとともに、ほ場の排水対策も心掛ける。



- エ 病勢が進展すると防除が困難になるので、初期防除を徹底する。
- オ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

2 すすかび病

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年並

(2) 予報の根拠

- ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年並であった（±）。

発病葉率 6.3%（平年 8.5%、前年 6.0%）

発生ほ場率 42.9%（平年 51.4%、前年 100%）

- イ 向こう1か月の気象予報では、やや少発生の条件となっている（-～±）。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 発病葉は見つけ次第速やかに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。


- イ 樹勢が低下すると発病が助長されるため、樹勢が低下しないよう肥培管理に努める。

- ウ 不要な枝葉は除去、処分し、通風、採光をよくする。

- エ 多湿にならないように換気に注意するとともに、ほ場の排水対策も心掛ける。

- オ 病勢が進展すると防除が困難になるので、初期防除を徹底する。

- カ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



3 ミナミキイロアザミウマ

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年並

(2) 予報の根拠

- ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年並であった（±）。

寄生葉率 0.4%（平年 1.0%、前年 1.7%）

発生ほ場率 28.6%（平年 21.4%、前年 28.6%）

- イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている（±）。

(3) 防除上注意すべき事項

- ア 多発後は防除が困難になるので、発生状況に注意し、発生初期の防除を徹底する。また、定期的な薬剤散布を実施する。

- イ 葉裏への寄生が多いので、散布ムラがないように丁寧に薬剤散布する。なお、薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。


- ウ 化学薬剤だけでは防除が困難であるため、天敵を利用した総合防除を積極的に実施する。

<県ホームページ掲載の「令和7年度版病害虫・雑草防除の手引き」-「IPMの推進」-「冬春なすIPMマニュアル」参照>

<https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bojonotebiki.html>

- エ ほ場内や周辺の雑草は増殖の場となるので、除草を徹底する。

- オ 施設内への成虫の飛び込みを防止するため、防虫ネットの目合は 0.4mm 以下にする。



【野菜：冬レタス】

1 灰色かび病

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年並

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年並であった（±）。

発病株率 0.8%（平年 0.6%、前年 0.2%）

発生ほ場率 16.7%（平年 17.1%、前年 20.0%）

イ 向こう1か月の気象予報では、やや少発生の条件となっている（～±）。


(3) 防除上注意すべき事項

ア 予防的に薬剤散布を行う。

イ 発病株は見つけ次第速やかに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。

ウ トンネル被覆後は、高温多湿にならないようにこまめな換気に努める。

エ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



2 菌核病

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年並

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年並であった（±）。

発病株率 0%（平年 0.5%、前年 0%）

発生ほ場率 0%（平年 28.8%、前年 0%）

イ 向こう1か月の気象予報では、やや少発生の条件となっている（～±）。

(3) 防除上注意すべき事項


ア 予防的に地際や葉の基部を主体に薬剤散布を行う。

イ 発病株は、菌核を作らないうちに土ごと抜き取り、ほ場外へ持ち出し処分する。

ウ トンネル被覆後は、高温多湿にならないようにこまめな換気に努める。

エ 発病株が確認されたほ場は、収穫後に反転耕を行い、5cmを超える深さに菌核を埋没させる。

オ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



【野菜：冬キャベツ】

1 黒腐病

(1) 予報の内容

発生量：平年よりやや少、前年並

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年よりやや少なかった（～±）。

発病株率 0.1%（平年 1.1%、前年 0.6%）

発生ほ場率 14.3%（平年 7.1%、前年 14.3%）


イ 向こう1か月の気象予報では、やや少発生の条件となっている（～±）。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 予防的に薬剤散布を行う。

イ 発病株は見つけ次第速やかに除去し、ほ場外へ持ち出し処分する。

ウ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



2 菌核病

(1) 予報の内容

発生量：平年よりやや少、前年並

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年よりやや少なかった（～±）。

発病株率 0.9%（平年 2.3%、前年 1.3%）

発生ほ場率 28.6%（平年 42.6%、前年 57.1%）

イ 向こう1か月の気象予報では、やや少発生の条件となっている（～±）。


(3) 防除上注意すべき事項

ア 発病株は、菌核を作らないうちに土ごと抜き取り、ほ場外へ持ち出し処分する。

イ 防除適期の結球開始期には、薬剤が株元にかかるよう丁寧に散布する。また、発生があった場合は、適宜防除を行う。

ウ 発病株が確認されたほ場は、収穫後に反転耕を行い、5cmを超える深さに菌核を埋没させる。

エ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



3 コナガ

(1) 予報の内容

発生量：平年・前年並

(2) 予報の根拠

ア 1月3半旬調査の結果、発生量は平年並であった（±）。

寄生株率 0%（平年 0.4%、前年 0%）

発生ほ場率 0%（平年 21.7%、前年 0%）


イ 向こう1か月の気象予報では、並発生の条件となっている（±）。

(3) 防除上注意すべき事項

ア 多発時には、結球内部まで食入り、被害が大きくなる。ほ場の発生状況に注意し、発生初期の防除に努める。

イ アブラナ科雑草は本虫の発生源となるため、ほ場周辺の除草を徹底する。

ウ 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用を避け、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。



農薬の安全・適正使用、飛散防止対策の徹底を！

福岡県では、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理、使用現場における周辺への配慮を周知徹底するとともに、農薬による事故防止を目的として、農薬適正使用の指導を関係機関、団体と一体となって取り組んでいます。使用者の安全はもちろん、周囲の人畜・隣接作物・河川等への配慮についてもご指導をお願いします。

1 農薬適正使用の徹底

- 適用作物、使用量や濃度、使用時期、総使用回数などが記載されたラベルをよく確認し、使用基準を遵守する。
※農薬の種類によっては、登録の内容がメーカーによって異なるので、ラベルをよく確認する。
- 有効期限切れの農薬は使用せずに、産業廃棄物として処分する。

2 飛散防止対策の徹底

- 風の弱い時に散布する。
- 風向、散布方向、散布時間、散布圧などに留意する。
- 飛散しにくい農薬（剤型）や飛散が少ないドリフト低減ノズルを使用する。
- 散布は場周辺の収穫前の作物には十分注意する。
- 農薬散布の実施において、周囲の生産者、住民に周知を図る。

3 保護具の着用

- 農薬の散布前に、ラベルの注意・警告マークをよく確認する。マスク、保護メガネ、ゴム手袋等を着用し、薬液を作成する。

4 農薬の散布後は、必ず散布器具を洗浄

- 噴霧器、薬液タンク、ホースなどの散布器具を十分に洗浄し、残液はほ場外への流出や環境や後作に影響を与えないよう配慮して、ほ場内の農作物が植え付けされていない土壌にまく。

5 防除履歴の記帳

- 農薬の散布が終わったら、作物名、ほ場の場所、使用年月日、薬剤名、使用濃度、使用量等を正確に記帳する。

6 空容器の処分

- 空容器は、地域の農業用廃プラスチック適正処理推進協議会が実施する回収や、産業廃棄物処理業者に委託するなど、適切な処分を行う。また、野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）』で禁止されているので、絶対に行わない。