

あたま う 頭を打った

ずつう おうと はんのう にぶ かのうせい
頭痛や嘔吐、反応が鈍くなる可能性があります

かんさつ 観察のポイント

- ・ ずつう うむ
頭痛の有無
- ・ はけ おうと うむ
吐き気、嘔吐の有無
- ・ けいれん うむ
けいれんの有無
- ・ はんのう うむ ふだん うこた
反応の有無（普段どおり／受け答えがあいまい）

ただちに、きゅうきゅうしゃ ようせい 救急車を要請

- ✓ しせんがあわな、つねっても はんのう
視線が合わない、つねっても反応しない、まったく動かない
- ✓ たくさんちがでて、とまらない
たくさん血が出ていて、止まらない
- ✓ けいれんしている
- ✓ はんのう
反応がないときがあった

すぐにじゅしん じかんい 受診（3時間以内）

- ✓ おうと
嘔吐があった
- ✓ たくさんちがでて、ちがでて きず
たくさん血が出た、血が出るような傷ができた

きょうじゅう じゅしん じかんいなし
今日中に受診（6時間以内）

- ✓ たんこぶが^{おお}大きくなってきた
- ✓ 呼びかけても目を開けない、いつもならなく

よくじつ じゅしん じかんいなし
翌日に受診（12～24時間以内）

- ✓ いつもどおりだが、たんこぶが^き気になる
- ✓ いつもどおりだが、^{しんばい}心配・^{ふあん}不安



せんもんい
専門医からのワンポイント・アドバイス

か
家庭でのケアのポイント

- ・ ^{あたま}頭を^う打った^{あと}後の^{ようす}様子を^{かんさつ}観察しましょう
- ・ ^{しゅっけつ}出血している^{ばあい}場合は、きれいなタオルで^お押しえましょう
- ・ たんこぶは^ひ冷やしてあげましょう
- ・ ^{あたま}頭を^う打ってから^{いちにち}一日は^{ようす}様子を^{かんさつ}観察しておきましょう

い
医師に伝えてほしいこと

- ・ ^{じょうきよう}どんな^{あたま}状況で^う頭を打ったか
- ・ いつもと^{こと}異なる^{ようす}様子があるか