

2026年度調査結果

ヒノキ球果ビーティングによる果樹カメムシ類捕獲虫数(頭)

調査時期：2026年8月5半旬

調査地点		①チャバネアオカメムシ									②ツヤアオカメムシ			③クサギカメムシ			①②③の合計			
		成虫数	幼虫数						計	幼虫比(%)	成虫数	幼虫数	計	成虫数	幼虫数	計	成虫数	幼虫数	合計	幼虫比(%)
			1齢	2齢	3齢	4齢	5齢	小計												
朝倉	筑前町 夜須 吹田①	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
	朝倉市 朝倉 宮野	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
	朝倉市 杷木 志波①	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0.0
	平均(3ヶ所)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0
久留米	久留米市 田主丸森部	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
	うきは市 吉井町 福益①	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
	うきは市 浮羽 小塩	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	8	0	8	0	0	0	9	0	9	0.0
	平均(3ヶ所)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	2.7	0.0	2.7	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0
筑後	八女市 黒木 今②	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
	八女市 立花 飛形山②	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
	みやま市 山川 立山	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	2	0	2	0	0	0	3	0	3	0.0
	平均(3ヶ所)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0
福岡・北九州・筑豊	糸島市 本	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.0
	宗像市 山田	0	0	0	0	0	0	0	0	－	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0.0
	遠賀町 上別府	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.0
	飯塚市 筑穂 山口	2	0	1	0	0	0	1	3	33.3	0	0	0	0	0	0	2	1	3	33.3
	みやこ町 勝山大久保①	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－
	平均(5ヶ所)	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	11.1	0.2	0.0	0	0.0	0.0	0	1.2	0.2	1.4	14.3
県内平均(14ヶ所)		0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	9.1	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.1	1.6	4.3
過去10年平均		3.9	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	2.0	5.9	33.3	1.0	0.4	1.4	0.3	0.1	0.4	5.1	2.6	7.7	33.2
2025年		3.8	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	2.6	6.4	40.8	1.0	0.6	1.6	0.2	0.1	0.4	5.1	3.3	8.4	39.4
2024年		1.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	2.0	10.7	0.4	0.1	0.6	0.0	0.1	0.1	2.2	0.5	2.7	18.4
2023年		2.3	0.0	0.4	0.3	0.1	0.1	0.9	3.1	27.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	2.6	1.1	3.7	30.8
2022年		7.7	0.4	0.2	0.4	0.0	0.6	1.6	9.3	17.1	0.8	0.4	1.2	0.5	0.0	0.5	8.9	2.0	10.9	18.3
2021年		8.3	0.1	0.3	0.4	0.6	0.1	1.4	9.6	14.4	1.9	0.5	2.4	0.5	0.8	1.3	10.6	2.7	13.4	20.4
2020年		2.3	0.0	0.0	0.2	0.6	0.7	1.5	3.7	39.5	0.5	0.2	0.7	0.0	0.1	0.1	2.8	1.7	4.5	38.4
2019年		2.9	1.3	0.4	0.3	0.4	1.1	3.6	6.4	55.6	1.1	0.3	1.4	0.2	0.0	0.2	4.1	3.9	8.0	48.2
2018年		4.4	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.6	5.0	11.8	0.9	0.1	1.0	0.3	0.0	0.3	5.7	0.8	6.4	12.1
2017年		3.1	0.0	1.2	0.4	0.9	0.2	2.6	5.7	46.3	2.9	1.1	3.9	0.7	0.1	0.8	6.6	3.8	10.4	36.3
2016年		2.4	2.2	1.9	0.8	0.0	0.4	5.4	7.7	69.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	2.5	5.7	8.2	69.6
2015年		2.0	0.5	1.3	1.6	1.1	1.7	6.2	8.2	75.6	0.8	2.2	3.0	0.1	0.1	0.2	2.8	8.5	11.4	75.0

注1)ビーティング調査は、1地点5枝、1枝当たり5回のたたき落とし

注2)小数点第2位を四捨五入

注3)チャバネアオカメムシの1世代期間(卵～次世代成虫)は、夏期で約30～40日

ヒノキ球果ビーティングによる果樹カメムシ類捕獲虫数(頭)

調査時期：2026年8月上旬

調査地点		①チャバネアオカメムシ									②ツヤアオカメムシ			③クサギカメムシ			①②③の合計			
		成虫数	幼虫数						計	(幼虫%虫比)	成虫数	幼虫数	計	成虫数	幼虫数	計	成虫数	幼虫数	合計	(幼虫%虫比)
			1 齢	2 齢	3 齢	4 齢	5 齢	小計												
朝倉	筑前町 夜須 吹田①	0	0	1	0	0	0	1	1	100	2	0	2	0	0	0	2	1	3	33
	朝倉市 朝倉 宮野	0	0	0	0	0	1	1	1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100.0
	朝倉市 杷木 志波①	2	0	0	0	0	0	0	2	0.0	0	2	2	0	0	0	2	2	4	50.0
	平均(3ヶ所)	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.7	1.3	50.0	0.7	0.7	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	2.7	50.0
久留米	久留米市 田主丸森部	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	うきは市 吉井町 福益①	3	0	0	0	0	0	0	3	0.0	0	2	2	0	0	0	3	2	5	40.0
	うきは市 浮羽 小塩	12	1	0	0	0	0	1	13	7.7	4	0	4	1	0	1	17	1	18	5.6
	平均(3ヶ所)	5.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.3	6.3	1.3	0.7	2.0	0.3	0.0	0.3	6.7	1.0	7.7	13.0
筑後	八女市 黒木 今②	2	1	0	0	0	0	1	3	33	0	0	0	0	0	0	2	1	3	33.3
	八女市 立花 飛形山②	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0.0
	みやま市 山川 立山	14	0	0	0	0	0	0	14	0.0	11	0	11	0	0	0	25	0	25	0
	平均(3ヶ所)	5.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	6.0	5.6	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.3	10.0	3.3
福岡・北九州・筑豊	糸島市 本	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	宗像市 山田	5	0	0	0	1	1	2	7	28.6	0	0	0	0	0	0	5	2	7	28.6
	遠賀町 上別府	2	1	0	0	0	0	1	3	33.3	2	0	2	0	0	0	4	1	5	20.0
	飯塚市 筑穂 山口	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	2	2	4	0	0	0	3	2	5	40.0
	みやこ町 勝山大久保①	2	0	0	0	0	0	0	2	0.0	1	1	2	0	0	0	3	1	4	25
	平均(5ヶ所)	2.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.6	2.6	15.5	1.0	0.6	2	0.0	0.0	0	3.0	1.2	4.2	28.6
県内平均(14ヶ所)		3.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	3.6	13.7	1.6	0.5	2.1	0.1	0.0	0.1	4.9	1.0	5.9	17.1
過去10年平均		3.7	0.1	0.7	1.0	0.9	1.3	4.0	7.7	49.8	0.7	1.7	2.4	0.2	0.2	0.4	4.6	5.8	10.5	54.0
2023年		1.7	0.0	0.0	0.3	0.5	0.1	0.9	2.6	33.3	0.1	0.6	0.6	0.1	0.2	0.4	1.9	1.6	3.6	46.0
2020年		3.3	0.3	0.9	0.6	0.5	0.3	2.5	5.8	43.7	0.5	0.5	0.9	0.2	0.0	0.2	4.0	3.0	7.0	43.0
2018年		8.0	0.2	1.1	1.6	1.4	2.5	6.8	14.8	45.9	1.6	3.7	5.3	0.5	0.4	0.9	10.1	10.9	21.0	52.0
2014年		1.8	0	0.9	1.3	1.2	2.4	5.8	7.6	76.3	0.7	1.9	2.6	0.1	0.1	0.2	2.6	7.8	10.4	75.0
2012年		3.9	0.3	0.1	0.8	0.8	2.1	4.1	8.0	51.3	0.7	0.1	0.8	0.1	0	0.1	4.7	4.2	8.9	47.2

注1)ビーティング調査は、1地点5枝、1枝当たり5回のたたき落とし

注2)小数点第2位を四捨五入

注3)チャバネアオカメムシの1世代期間(卵～次世代成虫)は、夏期で約30～40日

注4)8月2半旬調査は表記の年のみ実施

ヒノキ球果ビーティングによる果樹カメムシ類捕獲虫数(頭)

調査時期：2026年7月5半旬

調査地点		①チャバネアオカメムシ									②ツヤアオカメムシ			③クサギカメムシ			①②③の合計			
		成虫数	幼虫数						計	幼虫比(%)	成虫数	幼虫数	計	成虫数	幼虫数	計	成虫数	幼虫数	合計	幼虫比(%)
			1齢	2齢	3齢	4齢	5齢	小計												
朝倉	筑前町 夜須 吹田①	0	2	1	1	0	0	4	4	100.0	0	1	1	0	0	0	0	5	5	100.0
	朝倉市 朝倉 宮野	0	0	3	4	2	0	9	9	100	3	0	3	0	0	0	3	9	12	75.0
	朝倉市 杷木 志波②	3	1	0	1	0	1	3	6	50	0	0	0	0	0	0	3	3	6	50.0
	平均(3ヶ所)	1.0	1	1	2	1	0.3	5.3	6.3	84.2	1.0	0.3	1.3	0	0	0	2.0	5.7	7.7	73.9
久留米	久留米市 田主丸森部	0	0	1	1	0	0	2	2	100	0	0	0	0	0	0	0	2	2	100
	うきは市 吉井町 福益①	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	うきは市 浮羽 小塩	6	0	3	2	0	0	5	11	45	0	4	4	0	3	3	6	12	18	67
	平均(3ヶ所)	2.0	0.0	1.3	1	0.0	0	2.3	4.3	53.8	0.0	1.3	1.3	0	1	1	2.0	4.7	6.7	70.0
筑後	八女市 黒木 今②	20	8	0	0	0	0	8	28	28.6	0	0	0	0	0	0	20	8	28	28.6
	八女市 立花 飛形山②	8	0	0	0	0	0	0	8	0.0	3	0	3	1	0	1	12	0	12	0.0
	みやま市 山川 立山	0	0	0	0	0	1	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
	平均(3ヶ所)	9.3	3	0.0	0.0	0	0.3	3.0	12.3	24.3	1.0	0.0	1.0	0	0	0	10.7	3.0	13.7	22.0
福岡・北九州・筑豊	糸島市 本	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	4	0	4	0
	宗像市 山田	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
	遠賀町 上別府	8	0	0	0	0	0	0	8	0	3	0	3	0	0	0	11	0	11	0
	飯塚市 筑穂 山口	12	0	3	1	0	0	4	16	25.0	0	0	0	0	0	0	12	4	16	25.0
	みやこ町 勝山大久保①	1	1	3	0	0	0	4	5	80.0	1	0	1	0	0	0	2	4	6	67
	平均(5ヶ所)	4.8	0	1	0	0	0	2	6.4	21	1	0	1	0	0	0	6.0	1.6	7.6	21.1
県内平均(14ヶ所)		4.4	0.9	1.0	0.7	0.1	0.1	2.9	7.2	39.6	0.9	0.4	1.2	0	0	0	5.3	3.4	8.7	39.3
過去10年平均		4.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	2.4	6.7	34.9	1.1	0.5	1.6	0.2	0.1	0.4	5.5	3.1	8.6	35.1
2025年		0.2	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.5	0.7	70.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	69.2
2024年		2.6	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.7	3.4	21.3	0.4	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	3.1	1.4	4.4	30.6
2023年		1.4	0	0.1	0.3	0.2	0.2	0.9	2.3	37.5	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.4	1.9	1.2	3.1	39.5
2022年		3.9	0	0.3	0	0.5	0.6	1.6	5.5	28.8	2.7	1	3.7	1.4	0.0	1.4	8.0	2.6	10.6	24.4
2021年		1.0	0	0.0	0	0.2	0	0.7	1.7	42.4	0.2	0	0.3	0.4	0.1	0.5	1.5	1.0	2.5	38.7
2020年		6.8	0	0.5	0	0.2	0	0.6	7.5	8.5	0.2	0	0.2	0.2	0.5	0.6	7.2	1.1	8.3	13.2
2019年		0.7	0.3	0.6	0.4	0.1	0.4	1.8	2.5	71.4	1.1	0.7	1.9	0.3	0.1	0.4	2.1	2.6	4.7	54.5
2018年		4.2	1.8	3.6	1.8	1.8	1.6	10.5	14.7	71.4	2.0	5.3	7.3	0.9	0.8	1.6	7.1	16.6	23.6	70.1
2017年		1.5	0.1	0.4	0.2	0.4	0.9	1.9	3.4	56.3	0.7	0.9	1.6	0.4	0.5	0.9	2.6	3.3	5.9	55.4
2016年		0.9	0.4	1.1	0.4	0.1	0.2	2.1	3.0	71.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0	0.1	1.1	2.4	3.5	69.4
2015年		0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.4	0.8	45.5	0.5	0.4	0.8	0.1	0	0.1	1.0	0.8	1.8	43.5
2014年		6.2	0.3	3.4	0.8	0.3	0.2	5.0	11.2	44.8	1.8	0.4	2.2	0.3	0	0.5	8.2	5.7	13.8	41.0
2013年		1.0	0.1	0.2	1.0	0.5	0.6	2.3	3.3	70.3	0.2	0.3	0.5	0.0	0.0	0.1	1.2	2.6	3.8	68.9

注1)ビーティング調査は、1地点5枝、1枝当たり5回のたたき落とし

注2)小数点第2位を四捨五入

注3)チャバネアオカメムシの1世代期間(卵～次世代成虫)は、夏期で約30～40日