

公印省略

8農林試第1135号-2

令和8年9月7日

各関係機関団体の長
各病虫害防除員

} 殿

福岡県農林業総合試験場長
(福岡県病虫害防除所)

令和8度病虫害発生予察速報第2号について(送付)

このことについて、病虫害発生予察速報第2号(ハスモンヨトウ)を発表したので送付します。

速報第2号

1 対象作物:大豆

2 病虫害名:ハスモンヨトウ

3 発生地域:県下全域

4 予報の根拠

- (1) フェロモントラップにおける雄成虫の誘殺数が、8月5半旬から9月1半旬にかけて増加傾向にある(図1)。
- (2) 9月2半旬調査において、大豆ほ場でハスモンヨトウの卵塊、分散前後の若齢幼虫が確認されている。また、一部ほ場では、オオタバコガ、ウワバ類等の混発も確認されている。

5 防除上注意すべき事項

- (1) 大豆ほ場でハスモンヨトウや白変葉の発生状況を必ず確認し、薬剤防除を実施する。
- (2) 中齢幼虫になると薬剤の効果が低下するため、早期発見に努め、若齢幼虫のうちに薬剤防除を徹底する。
- (3) 薬剤感受性の低下を防ぐため、同一系統薬剤の連用は避け、ローテーション散布する。なお、一部の薬剤で感受性の低下が懸念されているため、薬剤の選定には十分注意する。
- (4) フェロモントラップを活用した防除適期の目安は、誘殺ピークから10日目頃であるが、地域によって誘殺数に差があるため、ほ場で発生状況を必ず確認し、防除する。






図1 フェロモントラップにおけるハスモンヨトウの誘殺成虫数の推移

病害虫防除所のホームページでは、各種病害虫の発生状況を随時更新しています。
発生状況の把握や防除の参考にご活用下さい。

○福岡県病害虫防除所のホームページへのアクセス

URL: <https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-bouzyosyo.html>

または右QRコード①

①⇒



○X (旧Twitter) で定期情報や警報等発出のお知らせを始めました。

Xの本アカウント (福岡県農作物病害虫情報) へのアクセス

URL: https://x.com/PPDPO_Fukuoka または右QRコード②

②⇒

