

いぐさ 除草剤一覧表

1. 畑苗床

2025年7月1日現在

除草剤名(登載年)	成分(%)	適用雑草	使用上の注意事項
ナブ乳剤 (1988)	セトキシジム(20.0)	水田一年生イネ科 雑草(スズメノカタビラ を除く)	1. 後期にノビエが多発する圃場で使用する。 2. 処理後完全枯死まで7~10日程度を要する。

2. 八月苗床

2025年7月1日現在

除草剤名(登載年)	成分(%)	適用雑草	使用上の注意事項
ベクサーフロアブル (2000)	ペソトキサゾン(2.9)	水田一年生雑草	1. 敷布後3~4日はそのまま湛水状態とする。 2. 水口からの一括施用は除草効果が不安定となるので行 わない。
ワンオール粒剤 (2008)	ヒラゾキシフェン(6.0) ブレチラクロール(1.5)	水田一年生雑草	1. 減水深の大きい水田(0.5cm/日以上)では使用しない。 散布後4~5日はそのまま湛水状態とする。

3. 本田

2025年7月1日現在

除草剤名(登載年)	成分(%)	適用雑草	使用上の注意事項
カソロン粒剤2.5 (1966)	DBN(2.5)	スズメノテッポウウ、ミズハコ ベ、水田一年生雑 草及びマツバイ	1. 減水深の大きい水田(0.5cm/日以上)では使用しない。 散布前には軽い地干しを行う。 2. 敷布後3~4日間はそのまま湛水状態とする。
デルカット乳剤 (2010)	オキサジアゾン(8.0) ブレチラクロール(12.0)	水田一年生雑草、 スズメノテッポウウ	1. 原液を湛水散布する。
ハーモニー細粒剤F (2010)	チフェンスルフロンメチル (0.15)	水田一年生広葉雑 草、スズメノテッポウウ	1. 落水後に全面土壌散布する。
ベクサーフロアブル (2000)	ペソトキサゾン(2.9)	水田一年生雑草	1. 敷布後3~4日はそのまま湛水状態とする。 2. 後処理剤と組み合わせて体系で使用する。 3. 敷布時に原液が付着すると褐変症状が生じるので、 収穫茎発生後には使用しない。 4. 水口からの一括施用は除草効果が不安定となるので行 わない。
ベクサー1キロ粒剤 (2001)	ペソトキサゾン(1.5)	水田一年生雑草	1. 敷布後3~4日はそのまま湛水状態とする。 2. 後処理剤と組み合わせて体系で使用する。 3. 深水状態では葉鞘部に褐変症状が生じる。
ナブ乳剤 (1988)	セトキシジム(20.0)	水田一年生イネ科 雑草(スズメノカタビラ を除く)	1. 本田後期のノビエが多発する圃場で使用する。 2. 処理後、完全枯死まで7~10日程度を要する。 3. 周辺の作物に飛散しないように注意する。
ワンオールS1キロ粒 剤 (1995)	ヒラゾキシフェン(18.0) ブレチラクロール(4.5) シメトリン(1.5)	水田一年生雑草	1. 減水深の大きい水田(0.5cm/日以上)では使用しない。 散布後4~5日はそのまま湛水状態とする。
ワンオール粒剤 (2008)	ヒラゾキシフェン(6.0) ブレチラクロール(1.5)	水田一年生雑草	1. 減水深の大きい水田(0.5cm/日以上)では使用しない。 散布後4~5日はそのまま湛水状態とする。
ワンサイドP乳剤 (1988)	フルアジホップP(17.5)	水田一年生イネ科 雑草	1. 本田後期のノビエが多発する圃場で使用する。 2. 処理後、完全枯死まで10~15日程度を要する。 3. 周辺の作物に飛散しないように注意する。